

ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة بولونيا شان تونغ البذور للإنبات

بولونيا نوع استئصال الصيني المعطر، المعطر تومينتوسا، بولونيا ثروة، بولونيا الهجين 9501، بولونيا شان تونغ

تكاثر طرق زراعة بولونيا أو شجيرة، الصيني المعطر قطع الجذور، الجذع الصيني المعطر، المعطر الجذر أو الجذعية، بولونيا البذور وهلم جرا

أرض M. مستوى المياه الجوفية: أكثر من 1.5. 1. التهوية الطمئية جيدة والتربة الرملية، تجنب permeability: قوام التربة. 2. الطين، تتصلب، والتربة الصارية التهوية. 3. التربة، 5-7، هو الأفضل، 5-8، غير مقبولة. PH. 4. والري الجيد وسيستيرم الصرف يكون أفضل. غير مقبول 5M. الارتفاع تصل إلى 2000

ماء ولود والرطب. لا البرك والمياه التشيع. 1. rainfull 400MM-1200MM. 2. السنوي في الفترة الشتلات، والحفاظ على التربة مع رطوبة جيدة (20-40%)، بعد يكبر من 3. ومقاومة للجفاف تحسين، ثم أفضل وأفضل. 50CM قدرة

إشراق 4. يرجى الانتباه: ما يكفي من المياه، لا البرك، والحفاظ على التنفس التربة شجرة الصيني المعطر مصنع في مكان مشمس والابتعاد عن الرياح العاتية. 1. 2. محاولة لمنع شجرة الصيني المعطر تحت أشجار أخرى أكبر أو أكبر 4x4m لالتشجير 4، 1x1m أو المسافة 1 3x1m. كثافة. لالشتلات باستخدام 0.8 مسافة.

درجة الحرارة 3x15m. محطة مع المحاصيل إبعاد أكثر من 3. تنمو على نحو أفضل؛ -20- + celsius درجة الحرارة السنوية درجة 12-20 درجة على ما يرام، عرضة لل أضرار الصقيع إذا كانت درجة حرارة 45celsius. 25- celsius. مطلقة أقل من درجة -25.

الأسمدة في البداية، ل البذور الصيني المعطر، وجذر الصيني المعطر والمعطر جدعة، وغيرها زراعة الصيني المعطر، وإعطاء الأسمدة قليلا، وفي المستقبل: أقل الأسمدة كمية. وأكثر من ذلك بكثير مرات.

فرق من البذور والجذور بولونيا سعر البذور هو أقل من ذلك، ولكن بذرة صغيرة جدا وخفيفة، عالية المتطلبات genn التقنية، وأنه من الصعب الحصول على أفضل الشتلات في واحد سنة. الحفاظ من مصنع الأصلي ليس على ما يرام، ومن السهل أن يكون لها ظاهرة الانفصال. (الطبيعة للأنواع الأصلية) paulowna المصنع من الجذر وبسيطة التقنية، وتوفير العمل و الوقت، والحصول على أفضل شجرة الصيني المعطر