

ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة بولونيا شان تونغ البذور للإنبات

بولونيا نوع

استطال الصيني المعطر، المعطر تومينتوسا، بولونيا ثروة، بولونيا الهجين 9501، بولونيا شان تونغ

تكاثر طرق

زراعة بولونيا أو شجيرة، الصيني المعطر قطع الجذور، الجذع الصيني المعطر، المعطر الجذر أو الجذعية، بولونيا البذور وهلم جرا

أرض

M. مستوى المياه الجوفية: أكثر من 1.5. 1.
أو التهوية الطمئية جيدة والتربة الرملية، تجنب permeability: قوام التربة. 2.
الطين، تتصلب، والتربة الصخرة التهوية.
التربة، 6-7، هو الأفضل، 5-8، غير مقبولة. PH. 3.
والري الجيد وسيستيرم الصرف يكون أفضل. 4.
غير مقبول 5M. الارتفاع تصل إلى 2000

ماء

ولود والرطب. لا البرك والمياه التشيع. 1.
rainfull 400MM-1200MM. 2. السنوي
في الفترة الشتلات، والحفاظ على التربة مع رطوبة جيدة (20-40%)، بعد يكبر من 3.
ومقاومة للجفاف تحسين، ثم أفضل وأفضل. CM قدرة 50

إشراق

4. يرجى الانتباه: ما يكفي من المياه، لا البرك، والحفاظ على التنفس التربة
شجرة الصيني المعطر مصنع في مكان مشمس والابتعاد عن الرياح العاتية. 1.
2. محاولة لمنع شجرة الصيني المعطر تحت أشجار أخرى أكبر
أو أكبر 4m x 4m للتشجير 4، 1m x 1 أو المسافة 1 3x1m. كثافة. لالشتلات باستخدام 0.8
مسافة.

درجة الحرارة

3x15m محطة مع المحاصيل إبعاد أكثر من 3.
تنمو على نحو أفضل؛ -20- + celsius درجة الحرارة السنوية درجة 12-20
درجة على ما يرام، عرضة للضرر الصقيع إذا كانت درجة حرارة 45 celsius.
مطلقة أقل من درجة -25 celsius.

الأسمدة

في البداية، ل البذور الصيني المعطر، وجذر الصيني المعطر والمعطر جذعة، وغيرها
زراعة الصيني المعطر، وإعطاء الأسمدة قليلا، وفي المستقبل: أقل الأسمدة كمية
وأكثر من ذلك بكثير مرات.

فرق من البذور والجذور

بولونيا سعر البذور هو أقل من ذلك، ولكن بذرة صغيرة جدا وخفيفة، عالية المتطلبات
genn التقنية، وأنه من الصعب الحصول على أفضل الشتلات في واحد سنة. الحفاظ
من مصنع الأصلي ليس على ما يرام، ومن السهل أن يكون لها ظاهرة الانفصال.
، الحفاظ على الطبيعة للأنواع الأصلية) paulowna المصنع من الجذر
وبسيطة التقنية، وتوفير العمل و الوقت، والحصول على أفضل شجرة الصيني
المعطر